

ANGABEN AUF DEM BEHÄLTNIS/DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG

1. BEZEICHNUNG DES ARZNEIMITTELS

Leber-Galle-Tee Kräutertee Nr. 18a

Arzneitee

Zur Anwendung bei Erwachsenen und Jugendlichen ab 12 Jahren

2. STOFF- UND INDIKATIONSGRUPPE

Pflanzliches Arzneimittel

3. ANWENDUNGSGEBIETE

Anwendungsgebiete

Zur Unterstützung bei der Behandlung von nichtentzündlichen Gallenblasenbeschwerden und bei Störungen im Bereich des Gallenabflusses; Beschwerden im Bereich von Magen und Darm wie Völlegefühl, Blähungen und Verdauungsbeschwerden.

4. ART DER ANWENDUNG

Art der Anwendung

Zum Trinken nach Bereitung eines Teeaufgusses.

5. GEGENANZEIGEN

Gegenanzeigen

Sie dürfen Leber-Galle-Tee Kräutertee Nr. 18a nicht einnehmen:

- bei Entzündungen oder Verschluss der Gallenwege, Gallensteinen und anderen Gallenerkrankungen
- bei Lebererkrankungen
- bei Darmverschluss
- bei Magen- und Zwölffingerdarmgeschwüren
- bei Überempfindlichkeit gegen einen der Bestandteile oder gegen andere Pflanzen der Familien der Asteraceae und/oder der Apiaceae (Fenchel, Anis, Sellerie, Koriander und Dill) sowie gegen Beifuß, Birke und Menthol.

6. VORSICHTSMAßNAHMEN FÜR DIE ANWENDUNG UND WARNHINWEISE

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise

Sie sollten Leber-Galle-Tee Kräutertee Nr. 18a erst nach Rücksprache mit einem Arzt einnehmen bei:

- Gastro-ösophagealem Reflux (Sodbrennen)
- Niereninsuffizienz und/oder Diabetes und/oder Herzinsuffizienz wegen möglicher Risiken aufgrund einer Hyperkaliämie.

Beim Auftreten von Ikterus oder einer Farbveränderung des Urins oder des Stuhls sollte sofort ein Arzt aufgesucht werden.

Kinder und Jugendliche

Zur Anwendung von Leber-Galle-Tee Kräutertee Nr. 18a bei Kindern liegen keine ausreichenden Untersuchungen vor. Er sollte deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.

Schwangerschaft und Stillzeit

Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen Sie vor der Anwendung dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Die Sicherheit während der Schwangerschaft und Stillzeit wurde nicht ausreichend untersucht. Daher wird die Anwendung während der Schwangerschaft und Stillzeit nicht empfohlen.

Zur Fortpflanzungsfähigkeit liegen keine Daten vor.

Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen

Untersuchungen zur Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit, Maschinen zu bedienen, wurden nicht durchgeführt.

7. WECHSELWIRKUNGEN MIT ANDEREN MITTELN UND NEBENWIRKUNGEN

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln

Bisher sind keine Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln im angegebenen Dosierungsbereich bekannt geworden. Untersuchungen mit Leber-Galle-Tee Kräutertee Nr. 18a zu Wechselwirkungen liegen nicht vor.

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/anwenden, kürzlich andere Arzneimittel eingenommen/angewendet haben oder beabsichtigen andere Arzneimittel einzunehmen/anzuwenden.

Nebenwirkungen

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Leichte gastrointestinale Symptome wie Mundtrockenheit, Übelkeit, Blähungen, Magenverstimmung, Magenreizungen und Durchfall sowie epigastrische Schmerzen und Übersäuerung können auftreten.

Der gastroösophageale Reflux kann sich verschlimmern, und Sodbrennen kann zunehmen.

Kopfschmerzen und allergische Reaktionen (Dermatitis, Urtikaria, Hautausschlag, Pruritus, Anaphylaxie, Asthma) können auftreten.

Die Häufigkeiten sind nicht bekannt.

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker oder das medizinische Fachpersonal. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die hier nicht angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, Website: www.bfarm.de anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

8. DOSIERUNGSANLEITUNG, ART UND DAUER DER ANWENDUNG

Dosierung und Art der Anwendung

Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren trinken, soweit nicht anders verordnet, 3- bis 4-mal täglich 1 Tasse des wie folgt frisch bereiteten Teeaufgusses eine halbe Stunde vor den Mahlzeiten:

1 Esslöffel voll Tee mit 150 ml siedendem Wasser übergießen und bedeckt etwa 10 bis 15 Minuten ziehen lassen. Danach abseihen.

Für konkrete Dosierungsempfehlungen bei eingeschränkter Nierenfunktion gibt es keine hinreichenden Daten.

Dauer der Anwendung

Wenn die Symptome während der Anwendung des Arzneimittels länger als 2 Wochen andauern oder beim Auftreten anderer als der auf der Packung erwähnten Nebenwirkungen sollte ein Arzt oder eine andere in einem Heilberuf tätige qualifizierte Person konsultiert werden.

Wenn Sie eine größere Menge von Leber-Galle-Tee Kräutertee Nr. 18a eingenommen haben als Sie sollten

In der Regel hat dies keine nachteiligen Folgen.

Es liegen keine Daten zu Überdosierungen vor.

9. HINWEISE UND ANGABEN ZUR HALTBARKEIT UND LAGERUNG

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

In der Originalverpackung aufbewahren, um den Inhalt vor Feuchtigkeit zu schützen.

10. ZUSAMMENSETZUNG, INHALT UND DARREICHUNGSFORM

Zusammensetzung

100 g Tee enthalten als Wirkstoffe:

- 10,0 g Kümmel
- 20,0 g Javanische Gelbwurz
- 30,0 g Löwenzahn
- 20,0 g Mariendistel Früchte
- 20,0 g Pfefferminzblätter

Darreichungsform und Inhalt

Packung mit 70 g Arzneitee

11. NAME UND ANSCHRIFT DES PHARMAZEUTISCHEN UNTERNEHMERS UND HERSTELLERS

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

Salus Haus GmbH & Co. KG

Bahnhofstraße 24

83052 Bruckmühl

info@salus.de

12. STAND DER INFORMATION

Stand der Information: Juli 2024

13. ZULASSUNGSNUMMER/REGISTRIERUNGSNUMMER

Zul.-Nr.: 1989.99.99

14. CHARGENBEZEICHNUNG/VERFALLDATUM

Ch.-B.:

Verwendbar bis:

15. VERKAUFSABGRENZUNG

16. INFORMATION IN BRAILLE-SCHRIFT

[Leber-Galle-Tee Kräutertee Nr. 18a]

17. WEITERE ANGABEN

Regt Gallenfluss und Fettverdauung an.

70 g

labpal-v1-2024-07-leber-galle-tee-kraeutertee-nr-18a