

## ANGABEN AUF DEM VORDERSEITENETIKETT

### 1. BEZEICHNUNG DES ARZNEIMITTELS

#### **RINGELBLUMENBLÜTEN**

Arzneitee zur Anwendung bei Erwachsenen und Kindern ab 12 Jahren

### 2. STOFF- UND INDIKATIONSGRUPPE/VERWENDUNGSZWECK

Pflanzliches Arzneimittel bei Entzündungen im Mund- und Rachenraum und zur Wundbehandlung

### 3. INFORMATION IN BRAILLE-SCHRIFT

*[Ringelblumenblüten]*

### 4. WEITERE ANGABEN

– Calendulae flos –

Aus ökologischem Landbau  
40 g

## ANGABEN AUF DEM RÜCKSEITENETIKETT

### 1. WIRKSTOFF(E)/ZUSAMMENSETZUNG

### 2. INHALT UND DARREICHUNGSFORM

#### **Zusammensetzung, Darreichungsform und Inhalt:**

40 g Arzneitee enthalten 40 g Ringelblumenblüten

### 3. ART DER ANWENDUNG

Zum Spülen des Mund- und Rachenraumes und für Umschläge nach Bereitung eines Aufgusses.

### 4. ANWENDUNGSGEBIETE

#### **Anwendungsgebiete:**

##### Innerliche, lokale Anwendung:

Entzündliche Veränderungen der Mund- und Rachenschleimhaut.

##### Äußerliche Anwendung:

Zur Behandlung von Wunden, auch mit schlechter Heilungstendenz, und von Unterschenkelgeschwüren.

#### Hinweis:

Sollten die Beschwerden bei leichten Schleimhautentzündungen im Mund- und Rachenraum länger als 1 Woche andauern, wiederkehren oder unklare Beschwerden auftreten, ist ein Arzt aufzusuchen.

Bei starker Rötung der Wundränder, bei großflächigen, nässenden oder eitrig infizierten Wunden ist die Rücksprache mit einem Arzt erforderlich.

### 5. VORSICHTSMAßNAHMEN FÜR DIE ANWENDUNG UND WARNHINWEISE

#### **Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:**

Zur Anwendung von Ringelblumenblüten in Schwangerschaft und Stillzeit sowie bei Kindern unter 12 Jahren liegen keine ausreichenden Untersuchungen vor. Zubereitungen aus Ringelblumenblüten sollen von diesem Personenkreis daher nicht angewendet werden.

### 6. GEGENANZEIGEN, WECHSELWIRKUNGEN MIT ANDEREN MITTELN UND NEBENWIRKUNGEN

#### **Gegenanzeigen, Wechselwirkungen mit anderen Mitteln und Nebenwirkungen:**

Keine bekannt.

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die hier nicht angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, Website: [www.bfarm.de](http://www.bfarm.de) anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

## 7. DOSIERUNGSANLEITUNG

### **Dosierungsanleitung:**

Soweit nicht anders verordnet, zur Anwendung im Mundbereich 2- bis 3-mal täglich mit einem noch warmen Aufguss spülen oder gurgeln. Zur Anwendung bei Wunden werden 2- bis 3-mal täglich mit einem Aufguss Umschläge bereitet.

Der Aufguss wird wie folgt hergestellt:

1 bis 2 Teelöffel voll (ca. 0,8 bis 1,6 g) Ringelblumenblüten mit sprudelnd kochendem Wasser (ca. 150 ml) übergießen und nach etwa 10 bis 15 Minuten abseihen.

## 8. HINWEISE

### **Hinweise:**

Arzneimittel für Kinder unzugänglich und vor Licht und Feuchtigkeit geschützt aufbewahren. Nach Ablauf des Verfalldatums nicht mehr anwenden.

## 9. NAME UND ANSCHRIFT DES PHARMAZEUTISCHEN UNTERNEHMERS

SALUS Haus GmbH & Co. KG  
Bahnhofstraße 24  
D-83052 Bruckmühl  
info@salus.de

## 10. STAND DER INFORMATION

**Stand der Information:** September 2013

## 11. ZULASSUNGSNUMMER

Zul.-Nr.: 1209.99.99

## 12. CHARGENBEZEICHNUNG

Ch.-B.:

## 13. VERFALLDATUM

Verwendbar bis: MM/JJJJ

## 14. WEITERE ANGABEN

Aus ökologischem Landbau