



## Gebrauchsinformation: Information für den Anwender

### Spitzwegerichblätter

Arzneitee zum Einnehmen nach Bereitung eines Teeaufgusses und zum Spülen oder Gurgeln sowie für Umschläge nach Bereitung eines Kaltausguges

**Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.**

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers an.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
- Wenn Sie sich nach 7 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

#### Was in dieser Packungsbeilage steht

1. Was sind Spitzwegerichblätter und wofür werden sie angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Spitzwegerichblättern beachten?
3. Wie sind Spitzwegerichblätter anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie sind Spitzwegerichblätter aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

#### 1. Was sind Spitzwegerichblätter und wofür werden sie angewendet?

Der Arzneitee Spitzwegerichblätter ist ein pflanzliches Mittel zur Behandlung von Atemwegserkrankungen sowie ein Mund- und Rachenmittel.

##### Innerliche Anwendung bei

Katarrhen der Luftwege; entzündlichen Veränderungen der Mund- und Rachenschleimhaut.

##### Äußerliche Anwendung bei

entzündlichen Veränderungen der Haut.

#### 2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Spitzwegerichblättern beachten?

**Spitzwegerichblätter dürfen nicht angewendet werden**, wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen Spitzwegerich sind.

#### Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Besondere Vorsicht bei der Anwendung von Spitzwegerichblättern ist erforderlich, wenn die unter Abschnitt 1 beschriebenen Beschwerden verstärkt auftreten. Fragen Sie in diesem Fall Ihren Arzt oder Apotheker. Teeaufgüsse sollen grundsätzlich mit kochendem Wasser zubereitet werden. Eine Zubereitung von Tee mit warmem Wasser ist nicht ausreichend. Für Kaltauszüge ist dieser Hinweis nicht relevant.

#### Kinder

Zur Anwendung von Spitzwegerichblättern bei Kindern unter 3 Jahren (Gurgeln, Umschläge) bzw. unter 12 Jahren (Einnahme) liegen keine ausreichenden Untersuchungen vor. Daher fragen Sie vor der Anwendung dieses Tees bei Kindern unterhalb des entsprechenden Alters Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

#### Anwendung von Spitzwegerichblättern zusammen mit anderen Arzneimitteln

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel anwenden, kürzlich andere Arzneimittel angewendet haben oder beabsichtigen, andere Arzneimittel anzuwenden. Wechselwirkungen sind keine bekannt.

#### Schwangerschaft und Stillzeit

Zur Anwendung von Spitzwegerichblättern in Schwangerschaft und Stillzeit liegen keine ausreichenden Untersuchungen vor. Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen Sie vor der Einnahme dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

#### Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen

Bisher liegen keine Hinweise auf eine Beeinträchtigung der Verkehrsfähigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen vor. Entsprechende Untersuchungen wurden mit Spitzwegerichblättern nicht durchgeführt.

### 3. Wie sind Spitzwegerichblätter anzuwenden?

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers an. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

#### Dosierung und Art der Anwendung

Soweit nicht anders verordnet, wird bei Katarrhen der Luftwege 3-mal täglich 1 Tasse des wie folgt bereiteten Teeaufgusses getrunken: 2 Teelöffel voll (ca. 1,4 g) Spitzwegerichblätter werden mit siedendem Wasser (ca. 150 ml) übergossen und nach etwa 10 bis 15 Minuten durch ein Teesieb gegeben.

Zum Spülen oder Gurgeln sowie zur Vorbereitung von Umschlägen wird 3-mal täglich ein Kaltauszug wie folgt in der angegebenen Menge oder dem benötigten Vielfachen hergestellt: 2 Teelöffel voll (ca. 1,4 g) Spitzwegerichblätter werden mit kaltem Wasser (ca. 150 ml) übergossen, unter öfterem Umrühren 1 bis 2 Stunden stehen gelassen und dann durch ein Teesieb gegeben.

Der Kaltauszug sollte direkt nach Zubereitung angewendet werden.

Zur äußerlichen Anwendung wird der Auszug mit einem sauberen Wundverband oder einer sauberen Wundkomresse auf die betroffene Hautstelle aufgebracht.

#### Dauer der Anwendung

Bei akuten Beschwerden, die länger als 1 Woche andauern oder periodisch wiederkehren, wird die Rücksprache mit einem Arzt empfohlen.

#### Wenn Sie eine größere Menge Spitzwegerichblätter angewendet haben, als Sie sollten

Wenn sich aufgrund der höheren Dosis Beschwerden einstellen, benachrichtigen Sie bitte Ihren Arzt. Dieser kann gegebenenfalls über erforderliche Maßnahmen entscheiden.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung dieses Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

### 4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Es sind keine Nebenwirkungen bekannt.

#### Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger Allee 3, D-53175 Bonn, Website: [www.bfarm.de](http://www.bfarm.de) anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

### 5. Wie sind Spitzwegerichblätter aufzubewahren?

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf. Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf dem Umkarton nach „Verwendbar bis“ angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats. In der Originalverpackung aufbewahren, um den Inhalt vor Licht und Feuchtigkeit zu schützen. Nicht über 25 °C lagern.

### 6. Inhalt der Packung und weitere Informationen Was Spitzwegerichblätter enthalten

100 g Arzneitee enthalten den Wirkstoff: 100 g Spitzwegerichblätter. Sonstige Bestandteile sind nicht enthalten.

#### Wie Spitzwegerichblätter aussehen und Inhalt der Packung

Loser Arzneitee im Umkarton mit Innenbeutel.

Spitzwegerichblätter ist in folgenden Packungsgrößen erhältlich:

- 75 g Arzneitee im Umkarton
- 28 g Arzneitee à 2 g (20 Aufgussbeutel)

#### Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

Bombastus-Werke AG, Wilsdruffer Straße 170, D-01705 Freital  
Telefon: +49 351 65803-0, E-Mail: [info@bombastus-werke.de](mailto:info@bombastus-werke.de)

**Diese Packungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet im November 2025.**